

事件概況：

沉寂一時的新沙士疫情在南韓持續擴散，一名患者日前過境香港前往內地，至五月廿九日被內地確診感染。

3. 隨後從沙頭角再轉乘巴士往惠州

與患者有密切接觸的19人已接受隔離



1. 確診感染個案於五月廿六日從南韓乘飛機到達香港國際機場

2. 再由香港國際機場乘巴士到沙頭角

中東呼吸綜合症簡介：

- 中東呼吸綜合症（俗稱新沙士）是由**冠狀病毒**引起
- 冠狀病毒在顯微鏡下呈皇冠狀因而命名。此種病毒的種類繁多，其中包括引致輕微疾病如傷風的病毒，亦包括可導致嚴重呼吸道疾病如沙士的類別
- 中東呼吸綜合症冠狀病毒於2012年首次被發現，之前從未在人類中出現過，亦與引起沙士的冠狀病毒屬不同種類
- 此病毒由發現至今，已造成全球超過1150宗感染，當中超過430人死亡

傳播途徑：

- 暫時仍未可完全確定中東呼吸綜合症的傳播途徑，估計與其他呼吸道傳染病相似，包括因**接觸患此病的動物（如駱駝）、確診的病人或受病毒污染的環壤而感染**
- 潛伏期約二至十四日

病徵：

- 一般急性呼吸道感染徵狀，包括發燒、咳嗽、呼吸急促、呼吸困難，大部份患者出現肺炎
- 部份患者亦出現腸胃方面的症狀（例如腹瀉）或者出現腎臟衰竭

治療方法：

- 在現階段，仍**未有**有效對抗此病毒的藥物及疫苗，只能對已入院的嚴重患者作呼吸支援。因此大家應加倍注意以下預防措施

預防方法：

- 冠狀病毒感染屬於呼吸道傳染病，因此**如出現呼吸道感染徵狀，應佩戴口罩，並盡快求醫**
- 時刻保持個人及環境衛生
- 經常**以正確方法洗手**或以酒精搓手液搓手
(特別在觸摸眼、鼻和口前，煮食或進食前，觸摸公共設施後，如廁後，咳嗽或打噴嚏後，接觸體液/呼吸道分泌物後，進入診所或醫院後)
- 咳嗽或打噴嚏時應用紙巾掩著口鼻，再將紙巾妥善棄置於有蓋垃圾箱內
- **增強個人抵抗力**：均衡飲食、適時運動及休息，避免煙酒
- 由於冠狀病毒擁有脂質外層，一般清潔劑能有效地消滅此病毒。因此清潔家居時，應以1比99稀釋家用漂白水消毒經常接觸的表面、傢具、共用物品和地板，待乾後再用清水過淨
- 保持室內**空氣流通**
- 避免前往人多擠迫、空氣不流通的地方
- 外出旅遊前(特別前往受影響的國家，包括南韓、沙特阿拉伯及阿聯酋等中東國家，如有不適，應延遲行程直至痊癒，並盡快求醫
- 在海外時，**避免接觸野生動物（尤其是駱駝）**。
如有生病，應告知酒店職員或領隊，並立即求醫
- 返港後如有不適(特別是呼吸道感染徵狀)，
應佩戴口罩並立即求醫，如實告知醫生近期的旅遊紀錄

